Chambre d'Agriculture
Lycée Technique Agricole
LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LIST
SENTINELLE
Université de Liège
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture

Schädlinge im Raps

29. September – 02. Oktober 2025

Ganz langsam geht es etwas ruhiger zu im Raps. In der letzten Nacht hat nicht viel zum ersten Bodenfrost gefehlt. Was etwas Sorge macht, sind schwache Rapsbestände ohne ausreichenden Beizschutz in Regionen mit hoher Rapserdflohdichte UND hohem Resistenzgrad. In Burmerange wurde der Bekämpfungsrichtwert auf einem einzelnen Schlag erreicht (**Bild 1**). Leider ist dort auch die Pyrethroidresistenz extrem ausgeprägt. Ich wiederhole mich hier gern: Ohne eine Strategie von Zulassung, Beratung und Landhandel für die Saatgutbeizen im Raps für die Saison 2026/27 werden wir massive Probleme mit dem Rapserdfloh bekommen! Der Zuflug des **Schwarzen Kohltriebrüsslers** ist bisher sehr verhalten und bisher nur zu Burmerange und Kehmen zu sehen. **Phoma** ist auf allen Schlägen zu finden, intensiviert sich aber durch die Sonneneinstrahlung etwas. Am stärksten ist Obercorn betroffen. Das Ösling zeigt nur wenige Pflanzen im Schlag mit Phoma-Symptomen. Achten Sie bitte noch auf Schnecken. Die Feldränder einiger Rapsschläge sind teilweise leergefressen. Das darf eigentlich nicht passieren.

Bild 1: Starker Schaden durch Rapserdfloh © Eickermann

Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am **02. Oktober 2025**. Angegeben ist jeweils die mittlere Anzahl des Schädlings pro Gelbschale, bzw. der mittlere prozentuale Anteil der zerstörten Blattfläche, bzw. eine Einschätzung der Zuflugstärke der Kohlfliege.

Region	**Minette**	**Mosel**	**Gutland**	**Oesling**	
Standort Sorte Saattermin	**Oberkorn** Columbia 25/08/2025	**Burmerange** Ceos 22/08/2025	**Everlange** Churchill 25/08/2025	**Kehmen** Daktari # 25/08/2025	**Reuler** Astana 22/08/2025
Rapserdflöhe pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert beträgt 50 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen (seit 01. Oktober)	2	6	2	8	1
% zerstörte Blattfläche durch den Rapserdfloh Bekämpfungsrichtwert: 10% pro Pflanze	<2%	10%	4%	4%	<2%
Schwarze Kohltriebrüssler pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert beträgt 10 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen	0	3	0	0	0
Zuflug Kohlfliege Bekämpfungsrichtwert unbekannt	sehr gering	sehr gering	sehr gering	sehr gering	sehr gering
Pflanzenkrankheiten	Phoma	Phoma	Phoma	Phoma	Phoma
Stadium Raps (in BBCH*)	15-16	13-14	15	15	15

= mit 10% Beimischung der Liniensorte Alicia als Fangpflanze zur Kontrolle des Rapsglanzkäfers
* **BBCH 14 =** Viertes Laubblatt entfaltet; **BCCH 15 =** fünftes Laubblatt entfaltet; **BBCH 16 =** Sechstes Laubblatt entfaltet

Bestand bereits behandelt | Bestand behandeln | Bestand kontrollieren | Keine Behandlung notwendig

Kurzfassung:

- **Auf Schnecken achten!**
- **Rapserdfloh zeigt schlagspezifisches Auftreten**
- **In Burmerange wurde auf einem einzelnen Schlag der Bekämpfungsrichtwert erreicht**
- **Zuflug Schwarzer Kohltriebrüssler sehr gering**
- **Phoma intensiviert sich etwas, aber noch auf niedrigem Niveau (am geringsten im Oesling, in Obercorn am stärksten)**
- **Grad des Phomabefalls bei der Einkürzung bei der Produktwahl berücksichtigen**

KONTAKT: Dr. Michael Eickermann
Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST)
Environmental Sensing and Modelling (ENVISION)
Agro-Environmental Systems Group
41, rue du Brill | L-4422 Belvaux | LUXEMBOURG
michael.eickermann@list.lu; 0049 173 377 58 18

Das Projekt „SENTINELLE" wird finanziert durch Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture